point onabet b

<div><div><div><div><div></div>&

lt;h2><div>Nomes comuns para medicamentos antifúngicos incluem:: : e:;:</div></h2></div>&lt

;div></div><div><div><div><div><

div>clotrimazol (Canesten)</div></div></div></div></div&

gt;<div></div><div><div><div><div><span&g

t;<div>econazol.</div></div></div></div&

gt;</div><div></div><div><div><div><div&g

t;<div>Miconazol.</div></div></div

></div></div><div></div><div><div><div

><div><div>terbinafina (Lamisil)</div></div></div></div&g

t;<div></div><div><div><div><div><span&gt

;<div>fluconazolona (Diflucano)</div></div></div></div

><div></div><div><div><div><div><span&

gt;<div>cetoconazol (Daktarin)</div></div></div></div&

gt;<div></div><div><div><div><div><span&g

t;<div>ninatinatina (Nistam)</div></div></div></div&gt

;<div></div><div><div><div><div>

<div>anfotericina.</div></div></div></di

v></div><div><div><a href=&quot

;{href}">Medicamentos antifúngicos - - NHSn<a href=&qu

ot;{href}">nhs.uk : condições ; antif anti-medicamentos</div

></div></div></div><div><div><d

iv></

div></div></div></div><div><div><div><

div><div><div><div><div>Candid Gel gel gelÉ usado para tratar infecções fúngic

as da pele, como micose (infecção da casca da lombriga fúngica qu) Tj T*□□BT /F1

;ngica e suor fúngico. erupção cutânea.</div></div></div></div>&